



# C h a t

## Sur animal mort

Herpès Virus Calicivirus Chlamydomphila Mycoplasma felis Bordetella bronchiseptica	Signes oculaires Conjonctivite  +/-  ou  si k�ratite Uv�ite  Syndrome coryza + rhinite  +/-  +/-  ou  ou 	 poumon
FeLV ou FIV	 +/-  si stomatite  ou 	 biopsie, organes ...
H�moplasmes	 	 rate
Toxoplasma gondii	 	 poumon, rate, foie ou enc�phale
Pathog�nes digestifs (Parvovirus Tritrichomonas, Giardia, Cryptosporidium, Salmonella sp)		
Coronavirus ent�rite	animal asymptomatique (statut) 	
PIF (coronavirus)	suspicion FORME HUMIDE  +  si �panchement pleural suspicion FORME S�CHE • signe nerveux ou uv�ite  • autres signes   si hyperthermie	 ou  foie, rein...  foie, rein, enc�phale...
Calicivirus hypervirulent	hyperthermie  autres signes    (nous contacter)	

-  Sang total non centrifug  sur tube EDTA
-  Urine (4mL si possible)\*
-  Moelle osseuse sur tube EDTA
-  Liquide c r brospinal (LCS) ou humeur aqueuse (HA)\*
-   panchement\*
-  LBA\*

\* tube EDTA ou tube sec

 Ecouvillon rectal

Cytobrosse ou  couvillon pour :

-  Cellules oro-pharyng es
-  Cellules vaginales ou pr puciales
-  Cellules conjonctivales
-  Cellules nasales

-  Calque de corn e
-  Organe ou biopsie (sans formol)
-  Cytoponction (ne pas envoyer l'aiguille)
-  Raclage cutan 



# C h i e n

Sur animal mort

Virus de la maladie de Carré	si signes nerveux et/ou	poumon, rein, foie
Toxoplasma gondii Neospora caninum Bornavirus	biopsie musculaire (néo)	encéphale muscle (Neo)
Parvovirus, Salmonella Giardia, Coronavirus Cryptosporidium		
Leishmanies	Animal sain Cas clinique (selon symptômes)  +  /  /  /  /  / Suivi traitement  puis	rate
Ehrlichia Hémoplasmes Borrelia Babesia	forme aiguë  + si signes nerveux forme chronique  +/-  (rate)	rate
Leptospires Hépatite de Rubarth (CAV1)	+  [  selon symptômes ]	foie, rein
Herpès virus canin	Signes respiratoires  +/- Signes oculaires  + Statut reproducteur  +	rate, rein, foie, poumon du chiot
Brucella spp.	+  reproducteur	rate, rein, foie, poumon du chiot
Bordetella bronch. Adenovirus respir (CAV2) Parainfluenza canin	[  +  ] ou	poumon
Virus Minute	selon symptômes  +/-  +/- Statut reproducteur  +  +	rate, rein, foie, poumon

- Sang total non centrifugé sur tube EDTA
- Urine (4mL si possible)\*
- Moelle osseuse sur tube EDTA
- Liquide cébrospinal (LCS) ou humeur aqueuse (HA)\*
- Epanchement\*
- LBA\*

\* tube EDTA ou tube sec

Ecouvillon rectal

Cytobrosse ou écouvillon pour :

- Cellules oro-pharyngées
- Cellules vaginales ou prépuçiales
- Cellules conjonctivales
- Cellules nasales

Calque de cornée

Organe ou biopsie (sans formol)

Cytoponction (ne pas envoyer l'aiguille)

Raclage cutané

Oiseaux		Sur animal mort
Sexage ADN	 et/ou 	
Virus de la PBFD (BFDV) Polyomavirus (APV)	animal malade  +  Follicule d'une jeune plume anormale en développement si troubles du plumage	 foie, rate, rein
	animal symptomatique seul  +/-  en collectivité  +  (= 2 recherches)	
Chlamydoiphila	animal asymptomatique 	
	animal malade  + 	 foie, rate, rein

Lapin		Sur animal mort
RHDV1 + RHDV2 (virus de la VHD souche classique + variant)	animal malade  animal asymptomatique  +/-  +/-  +/- 	 Foie
Virus de la Myxomatose	 +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-	